




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

6 мая 2024 г.



№ 226Н

**Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов
и маневровой работой**

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.87 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. № 796 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2006 г., регистрационный № 7442).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

Министр

М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от « 6 » *мая* 2024 г. № 226Н

**ПЕРЕЧЕНЬ
Медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных
с движением поездов и маневровой работой**

| № п/п | Наименование заболеваний | Код по МКБ-10 ¹ | Осложнения | Степень нарушения функций организма | Группы профессий и должностей, работа в которых противопоказана ² | | Примечание |
|---|---|--|--|---|--|-----------|------------|
| | | | | | поступающие на работу | работники | |
| I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | | | |
| 1. | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | A00.0; A00.1; A01.0-A01.3; A02.0-A02.2; A02.8; A03.0-A03.3; A03.8; A04.0-A04.8; A05.0-A05.4; A05.8; A06.0-A06.8; A07.0-A07.3; A07.8; A08.0-A08.4; A09.0; A20.0-A20.3; A20.7; A20.8; A21.0-A21.3; | Упорно текущие, прогрессирующие тяжёлые инфекционные болезни | Выраженное нарушение функции органов и систем | I-VI | I-VI | |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

² В соответствии с Перечнем профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020.

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | A21.7; A21.8; A22.0-A22.2; A22.7; A22.8; A23.0-A23.3; A23.8; A24.0-A24.3; A25.0; A25.1; A26.0; A26.7; A26.8; A27.0; A27.8; A28.0-A28.2; A28.8; A30.0-A30.5; A30.8; A31.0; A31.1; A31.8; A32.0; A32.1; A32.7; A32.8; A35; A36.0-A36.3; A36.8; A37.0; A37.1; A37.8; A38; A39.0-A39.5; A39.8; A42.0-A42.2; A42.7; A42.8; A43.0; A43.1; A43.8; A44.0; A44.1; A44.8; A46; A48.0-A48.4; A50.0-A50.7; A51.0-A51.5; A52.0-A52.3; A52.7; A52.8; A53.0; A54.0-A54.6; A54.8; | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | B00.0-B00.5; B00.7; B00.8; B01.0-B01.2; B01.8; B02.0-B02.3; B02.7; B02.8; B03-B05; B06.0; B06.8; B07; B08; B15; B16; B17.0-B17.2; B17.8; B18.0-B18.2; B18.8; B25.0-B25.2; B25.8; B26.0-B26.3; B26.8; B27.0; B27.1; B27.8; B30.0-B30.3; B30.8; B33; B34.0-B34.4; B34.8; B35.0-B35.6; B35.8; B36.0-B36.3; B36.8; B37.0-B37.8; B38.0-B38.4; B38.7; B38.8; B39.0-B39.5; B40.0-B40.3; B40.7; B40.8; B41.0; B41.7; B41.8; B42.0; B42.1; B42.7; B42.8; B43.0-B43.2; | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------|------|--|
| | | B82.0; B83.0-B83.8; B85; B86; B87.0-B87.8; B88.0-B88.8 | | | | | |
| 2. | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически, туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | A15.0-A15.8; A16.0-A16.5; A16.7; A16.8 | Активный туберкулез с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани; активный туберкулез без выделенных микобактерий и наличия распада легочной ткани; дыхательная недостаточность II и III степени, в том числе после хирургического лечения | Тяжелая и средняя степень нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| | | | Значительные остаточные изменения легких и плевры; дыхательная недостаточность I степени, в том числе после хирургического лечения | Легкая степень нарушения функции | I-VI | I, V | |
| 3. | Туберкулез нервной системы, туберкулез других органов, милиарный туберкулез | A17.0; A17.1; A17.8; A18; A19.0-A19.2; A19.8 | Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем независимо от характера течения, давности и исхода; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза | Выраженное нарушение функции | I-VI | I-VI | |
| 4. | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] | B20.0-B20.8; B21.0-B21.3; B21.7; B21.8; B22; B22.0-B22.2; B22.7; B23; B24 | Наличие клинических проявлений в виде инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, других состояний | Выраженное нарушение функции | I-VI | I-VI | |

II Новообразования

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|------|------|--|
| 5. Злокачественные новообразования | <p>C00.0-C00.6; C00.8; C01; C02.0-C02.4; C02.8; C03.0; C03.1; C04.0; C04.1; C04.8; C05.0-C05.2; C05.8; C06.0-C06.2; C06.8; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C09.0; C09.1; C09.8; C10.0-C10.4; C10.8; C11.0-C11.3; C11.8; C12; C13.0-C13.2; C13.8; C14.0; C14.2; C15.0-C15.5; C15.8; C16.0-C16.6; C16.8; C17.0-C17.3; C17.8; C18.0-C18.8; C19-C21; C22.0-C22.4; C22.7; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C25.0-C25.4; C25.7; C25.8; C26.0; C26.1;</p> | <p>Злокачественные новообразования с метастазами и осложнениями, а также рецидив заболевания после ранее проведенного лечения; невозможность радикального удаления новообразования; злокачественные заболевания лимфатической, кровяной и родственной им тканей при отсутствии или временном эффекте от проводимого лечения, при отказе от лечения злокачественного новообразования</p> | <p>Тяжелое прогрессирующее течение с выраженным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной,</p> | I-VI | I-VI | I (Машинисты, работающие без помощника) |
| | | | <p>Медленно прогрессирующее течение с умеренным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной,</p> | I-VI | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------|---|--|
| | <p>C26.8; C30; C31.0-C31.3; C31.8; C32.0-C32.3; C32.8; C33; C34.0-C34.3; C34.8; C37; C38; C39.0; C39.8; C40.0-C40.3; C40.8; C41.0-C41.4; C41.8; C43.0-C43.8; C44.0-C44.8; C45.0-C45.2; C45.7; C46.0-C46.3; C46.7; C46.8; C47.0-C47.6; C47.8; C49.0-C49.6; C49.8; C50.0-C50.6; C50.8; C51.0-C51.2; C51.8; C52; C53.0; C53.1; C53.8; C54.0-C54.3; C54.8; C55; C56; C57.0-C57.4; C57.7; C57.8; C58; C60.0-C60.2; C60.8; C61; C62.0; C62.1;</p> | | <p>Эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций при длительном положительном эффекте от лечения</p> | I-VI | - | |
|--|---|--|--|------|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|--|
| | <p>С63.0-С63.2; С63.7; С63.8; С64-С66; С67.0-С67.8; С68.0; С68.1; С68.8; С69.0-С69.6; С69.8; С70.0; С70.1; С71.0-С71.8; С72.0-С72.5; С72.8; С73;</p> | <p>Злокачественные новообразования после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфогейкоз без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли</p> | <p>После эффективного радикального лечения без нарушения функции</p> | <p>I-V</p> | <p>-</p> | |
| | <p>С74.0; С74.1; С75.0-С75.5; С75.8; С76; С77.0-С77.5; С77.8; С78; С79.0-С79.8; С80.0; С81.0-С81.4; С81.7; С82.0-С82.7; С83.0-С83.8; С84.0-С84.8; С85.0-С85.2; С85.7; С86; С88.0-С88.4; С88.7; С90; С91.0-С91.8; С92.0-С92.8; С93.0-С93.3; С93.7; С94; С95.0-С95.2; С95.7; С96.0-С96.8</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|------|------|--|
| 6. | Новообразование in situ | D00; D01.0-D01.5; D01.7; D02.0-D02.3; D03.0-D03.8; D04.0-D04.8; D05.0; D05.1; D05.7; D06.0; D06.1; D06.7; D07; D09.0-D09.3; D09.7 | Новообразование in situ после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфопейкоз без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли | После эффективного радикального лечения без нарушения функций | I | - | С учетом заочтения онколога и при условии отсутствия контакта с канцерогенами на рабочем месте |
| 7. | Доброкачественные новообразования | D10.0-D10.7; D11.0; D11.7; D12.0-D12.8; D13.0-D13.7; D14.2; D14.3; D15.0-D15.2; D15.7; D16.0-D16.8; D17.0-D17.7; D18; D19.0; D19.1; D19.7; D20; D21.0-D21.6; D22.0-D22.7; D23.0-D23.7; D24; D25.0-D25.2; D26.0; D26.1; D26.7; D27; D28.0-D28.2; D28.7; D29.0-D29.4; D29.7; D30.0-D30.4; D30.7; D31.0-D31.6; D34; | Доброкачественные новообразования, удаление которых влечет за собой выраженные нарушения функции органов и систем | Выраженное нарушение функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций | I-VI | I-VI | Кроме опухолей нервной системы |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | D35.0-D35.8; D36.0; D36.7 | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|

III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------|------|--|
| 8. | Анемии, связанные с питанием, гемолитические, апластические и другие анемии | D50.0; D50.1; D50.8; D51.0-D51.3; D51.8; D52.0; D52.1; D52.8; D53.0-D53.2; D53.8; D55.0-D55.3; D55.8; D56.0-D56.4; D56.8; D57; D58.0-D58.2; D58.8; D59.0-D59.6; D59.8; D60.0; D60.1; D60.8; D62; D64.0-D64.4; D64.8 | Врожденные и приобретенные хронические анемии, прогрессирующие и выраженной степени с упорным течением, резистентные к проводимому лечению | Тяжелая и средняя степень с выраженным нарушением функций | I-VI | I-VI | |
| | | D53.8; D55.0-D55.3; D55.8; D56.0-D56.4; D56.8; D57; D58.0-D58.2; D58.8; D59.0-D59.6; D59.8; D60.0; D60.1; D60.8; D62; D64.0-D64.4; D64.8 | Врожденные и приобретенные хронические анемии, резистентные к проводимому лечению | Легкая степень с незначительным нарушением функций | I-VI | I | |
| 9. | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | D65-D67; D68.0-D68.6; D68.8; D69.0-D69.6; D69.8 D70; D71; D72.0; D72.1; D72.8; D73.0-D73.5; D73.8; D74.0; D74.8; D75.0-D75.2; D75.8; D76; D80.0-D80.8; | Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с частыми рецидивами (два и более раз в год), рецидивирующий кожно-абдоминальный геморрагический васкулит, вторичные полицитемии с ишемическими осложнениями, саркоидоз IV стадии с дыхательной недостаточностью, гиастоцитоз легких с дыхательной недостаточностью, хронические | Тяжелая и средняя степень со значительным (выраженным) нарушением функций | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|
| | D81.0-D81.8; D82.0-D82.4; D82.8; D83.0-D83.2; D83.8; D84.0; D84.1; D84.8; D86.0-D86.3; D86.8; D89.0-D89.3; D89.8 | иммунодефициты с инфекционными осложнениями Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с редкими рецидивами, хронический рецидивирующий кожно- суставной васкулит, вторичная полицитемия без осложнений, гистиоцитоз легких без дыхательной недостаточности, саркоидоз III стадии без дыхательной недостаточности | Средняя степень с умеренным нарушением функции | I-VI | I | |
| | | Хронические коагулопатии, хронический рецидивирующий кожный васкулит, хронический иммунодефицит без инфекционных осложнений, саркоидоз I-II стадии без дыхательной недостаточности | Легкая степень с незначительным нарушением функции | I-VI | - | |

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|---|------|------|--|
| 10. | Болезни щитовидной железы | E00.0-E00.2; E01; E02; E03.0-E03.5; E03.8; E04.0-E04.2; E04.8; E05.0-E05.5; E05.8; E06.0-E06.5; E07.0; E07.1; E07.8 | Кретинизм, тяжелый типертиреоз, некомпенсированный гипотиреоз, эндокринная офтальмопатия, эндокринная кардиопатия, зоб с компрессионным синдромом, рецидив после струмаэктомии Без осложнений | Тяжелая степень с выраженным нарушением функций | I-VI | I-VI | I (Машинисты, работающие без помощника) |
|-----|------------------------------|--|--|---|------|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|--|--|------|------|--|
| | | | | состояния, состояния после успешного радикального лечения | | | |
| 11. | Сахарный диабет | E10-E14 | <p>Диабетическая ретинопатия</p> <p>препролиферативная или пролиферативная, диабетическая нефропатия СЗБ -5 по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия в стадии осложнений, диабетическая нейроостеоартропатия, синдром диабетической стопы, диабетические макроангиопатии</p> | <p>Любая степень нарушения функции или без нарушения функции на инсулинотерапии</p> <p>С выраженным нарушением функции, гликированный гемоглобин (HbA1c) выше целевых значений</p> | I-VI | I-VI | |
| | | | <p>Диабетическая ретинопатия непролиферативная, диабетическая нефропатия С1-3А по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия без осложнений</p> | <p>С умеренным нарушением функции на таблетированной сахароснижающей терапии, гликированный гемоглобин (HbA1c) соответствует целевым значениям</p> | I-VI | I | (Машинист, работающие без помощника) |
| 12. | Ожирение | E66.0-E66.2; E66.8 | Сердечно-легочная недостаточность, синдром obstructивного апноэ сна (СОАС) средней или тяжелой степени тяжести, нарушения функции опорно-двигательного аппарата | | I-VI | I-VI | Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 35 (при наличии осложнений); Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 40 (вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений) |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|--|------|--------------------------------------|--|
| | | Без осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата | Состояние после успешного хирургического лечения с эффектом снижения индекса массы тела менее 40 и значимого регресса ассоциированных заболеланий сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата | I | - | Индекс массы тела равен или более 35 | |
| 13. | Нарушения других эндокринных желез | E20.0; E20.1; E20.8; E21.0-E21.4; E22.0-E22.2; E22.8; E23.0-E23.3; E23.6; E24.0-E24.4; E24.8; E25.0; E25.8; E26.0; E26.1; E26.8; E27.0-E27.5; E27.8; E28.0-E28.3; E28.8; E29.0; E29.1; E29.8; E30.0; E30.1; E30.8; E31.0; E31.1; E31.8; E32.0; E32.1; E32.8; E34.0-E34.5; | Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Тяжелая степень с выраженным нарушением функций, недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ) менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин | I-VI | I-VI | |
| | | Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии | I-VI | I | | |
| | | Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Легкая степень без или с незначительными нарушениями функций на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее, | I | - | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|------|------|--|--|
| | | E34.8 | | состояния после успешного хирургического лечения | | | | |
| 14. | Недостаточность питания | E40-E46 | Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Тяжелая степень с выраженным нарушением функции, недостаточность питания с индексом массы тела менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин | I-VI | I-VI | | |
| | | | Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии | I-VI | I | | |
| | | | Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем | Легкая степень без или с незначительными нарушениями функции на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее, состояния после успешного хирургического лечения | I | - | | |
| V Психические расстройства и расстройства поведения | | | | | | | | |
| 15. | Сосудистая деменция, деменция неуточненная | F01.0-F01.3; F01.8; F03 | | | I-VI | I-VI | | |
| 16. | Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психотропными | F04 | | | I-VI | I-VI | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------|------|--|
| | веществами | | | | | | |
| 17. | Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами | F05.0; F05.1; F05.8 | | | I-VI | I-VI | |
| 18. | Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью | F06.3-F06.8 | | | I-VI | I-VI | |
| 19. | Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга | F07.0-F07.2; F07.8 | | | I-VI | I-VI | |
| 20. | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | F10.0-F10.8; F11.0-F11.8; F12.0-F12.8; F13.0-F13.8; F14.0-F14.8; F15.0-F15.8; F16.0-F16.8; F18.0-F18.8; F19.0-F19.8 | | | I-VI | I-VI | |
| 21. | Шизофрения, шизогипнотические и бредовые расстройства | F20.0-F20.6; F20.8; F21; F22; F23.0-F23.3; F23.8; F24 F25.0-F25.2; F25.8; F28; F29 | | | I-VI | I-VI | |
| 22. | Маниакальный эпизод | F30.0-F30.2; F30.8 | | | I-VI | I-VI | |
| 23. | Биполярное аффективное расстройство | F31.0-F31.8 | | | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--------------|--------------|--|
| 24. | Расстройства настроения [аффективные расстройства] | F32.0-F32.3; F32.8; F33.0-F33.4; F33.8; F34.0; F34.1; F34.8; F38; F39 | С психотическими симптомами и без психотических симптомов Без осложнений | Тяжелая степень и средняя степень нарушения функции Легкая степень нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| 25. | Неврологические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, | F40.0-F40.2; F40.8; F41.0- F41.3; F41.8 F42.0-F42.2; F42.8; F43.0- F43.2; F43.8; F44.0-F44.8; F45.0-F45.4; F45.8; F48.0; F48.1; F48.8 | | Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями | I-VI I-VI | I-VI I-VI | |
| | поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | F50.0-F51.5; F51.0; F51.8 | | Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями; недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ) | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Менее 16 у мужчин и Менее 15 у женщин | | | |
| | F53.0; F53.1; F53.8 | | | Тяжелая степень нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| | F54 | | | Легкая степень нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| | | | | Хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями | I-VI | I-VI | |
| 26. | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | F60.0-F60.8; F61; F62; F62.0; F62.1; F62.8; F63.0-F63.3; F63.8; F68 | | | I-VI | I-VI | |
| 27. | Умственная отсталость | F70-F73; F78 | | | I-VI | I-VI | |
| 28. | Расстройства психологического развития, другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | F80.0-F80.3; F80.8; F81.0-F81.3; F81.8; F82; F83; F84.0-F84.5; F84.8; F88 F98.5; F98.6 | Затруднение общения | | I-VI I-VI I-VI | I-VI I-VI I-VI | |

VI Болезни нервной системы

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------|------|--|
| 29. Воспалительные болезни центральной нервной системы | G00.0-G00.3; G00.8; G03.0-G03.2; G03.8; G04.0-G04.2; G04.8; G06.0-G06.2; G08 | Хронические и рецидивирующие миелиты и энцефаломиелиты, последствия острых энцефалитов, менингитов, миелитов, энцефаломиелитов в виде одного или нескольких стойких выраженных основных неврологических синдромов, последствия острых воспалительных заболеваний центральной нервной системы со стойкими неврологическими симптомами | Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции | I-VI | I-VI | |
| 30. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, | G10; G11.0-G11.4; G11.8; G12.0-G12.2; G12.8; G14; G20; G21.0-G21.4; G21.8; G23.0-G23.3; G23.8; G24.0-G24.5; G24.8; | Экстрапирамидные и двигательные нарушения со стойкими неврологическими симптомами, в том числе прогрессирующего течения, когнитивные нарушения умеренной и выраженной степени, в том числе прогрессирующего течения, сосудистые и иные энцефалопатии со стойкими и умеренно выраженными основными неврологическими симптомами | Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|-------------|-------------|--|
| | <p>Другие дегенеративные Болезни нервной системы,</p> | <p>G25.0-G25.6; G25.8; G30.0; G30.1; G30.8; G31.0-G31.2; G31.9; G35; G36.0; G36.1; G36.8; G37.0-G37.5; G37.8</p> | <p>синдромами, вследствие оперативного лечения опухоли головного и спинного мозга с нарушением функций</p> | | | | |
| 31. | <p>Эпизодические и пароксизмальные расстройства</p> | <p>G40.0-G40.8; G41.0-G41.2; G41.8; G43.0-G43.3; G43.3; G44.0-G44.2; G44.4; G44.8; G45.0-G45.4; G45.8; G47.0-G47.2; G47.4; G47.8</p> | <p>Эпилепсия, тяжелая мигрень, нарколепсия и каталепсия, другие пароксизмальные расстройства сознания, обусловленные хроническими заболеваниями, а также любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и (или) прикусом языка и (или) утрусанием мочи, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, переходящие транзиторные церебральные ишемические приступы, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, логоневроз при нарушении профессионально значимых функций, энурез</p> | <p>Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |
| | | | <p>Эпизоды диффузной</p> | <p>Выраженные</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|------|------|--|
| | | | спонтанной активности и затяжной спонтанной активности на электроэнцефалограмме без клинической манифестации | функциональные отклонения без клинической манифестации | | | |
| | | | Короткие эпизоды очаговой спонтанной активности на электроэнцефалограмме при отсутствии неврологической симптоматики | Легкие функциональные отклонения без клинической манифестации | I | I | |
| | | | Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | Легкая степень нарушения функций | I-VI | I-VI | |
| | | | Синкопальные состояния | Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции | I-VI | I-VI | |
| | G47.3 | | | Легкая или умеренная степень нарушения функции после эффе́ктивной коррекции синдрома обструктивного апноэ сна | I-VI | - | |
| 32. | Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, мультиpla gravis и другие нарушения нервно- мышечного сигнала, | G50.0; G50.1; G50.8; G51.0-G51.4; G51.8; G52.0-G52.3; G52.7; G52.8; G54.0-G54.8; G56.0-G56.4; G56.8; G57.0-G57.6; G57.8; G58.0; G58.7; G58.8; | Тяжелое и среднетяжелое, прогрессирующее течение заболевания, поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных корешков, протекающие с частыми обострениями (более трех раз в год), течение заболевания с выраженными клиническими проявлениями | Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------|--|
| | <p>первичные поражения мышц</p> | <p>G60.0-G60.3; G60.8; G61.0; G61.1; G61.8; G62.0-G62.2; G62.8; G64; G70.0-G70.2; G70.8; G71.0-G71.3; G71.8</p> | <p>Умеренные поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных сплетений и корешков, течение заболевания с легкими частичным нарушением чувствительных и двигательных функций и редкими обострениями (не более трех раз в год)</p> | <p>Легкая или умеренная степень с частичным нарушением функции</p> | <p>I-VI</p> | <p>I, III, V, VI (кроме начальников и инженеров)</p> |
| <p>33. Хроническая посттравматическая головная боль, гемиплегия, параллелия и тетраплегия, другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы, посттравматическая гидроцефалия неуточненная, периферическая киста, энцефалопатия неуточненная, другие уточненные поражения головного мозга</p> | <p>G44.3; G81.0; G81.1; G82.0-G82.4; G90.8; G91.3; G93.0; G93.4; G93.8</p> | <p>Последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций головного или спинного мозга (ушибы и сдавления мозга, приводящие к стойким параличам или глубоким парезам, нарушению функций тазовых органов и другие), с расстройством корковых функций (афазия, агнозия, апраксия и другие), мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления с выраженными клиническими проявлениями</p> | <p>Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> |
| | | <p>Последствия травм головного или спинного мозга, при которых очаговые симптомы и расстройства функций не</p> | <p>Средняя степень нарушений функций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--|--|
| | <p>Достигают значительной степени выраженности: стойкий парез, стойкие когнитивные нарушения, мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления</p> | | | | |
| <p>Последствия травматического повреждения головного или спинного мозга, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты без синдрома повышения внутричерепного давления, при которых в неврологическом статусе выявляются рассеянные органические знаки (асимметрия черепной иннервации и анизорефлексия, легкие расстройства чувствительности и другие), сочетающиеся с легкими когнитивными нарушениями, стойким синдромом вегетативной дистонии и стойкими астеноневротическими проявлениями, а также старые вдавненные переломы черепа без признаков органического поражения и нарушения</p> | <p>Легкая степень нарушения функции</p> | <p>I-VI</p> | <p>I, II</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|---|---|--|
| | | функций | Последствия травм головного или спинного мозга, при которых имеются отделимые рассеянные органические знаки, вегетативно-сосудистая неустойчивость и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных и координаторных функций нервной системы | При наличии объективных данных без нарушения функции | I | - | |
|--|--|---------|---|--|---|---|--|

VII Болезни глаза и его придаточного аппарата

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|------|--|--|
| 34. | Болезни век, слезных путей и глазницы, | N00 | Неполное закрытие глаза, изъязвление края века, опущение века, сращение век, упорное слезотечение вызванное хроническими заболеваниями конъюнктивы, слезных путей и глазницы | I-VI | I-VI | | |
| | | N01.1; N01.8; N02.0-N02.8; N04.0-N04.6; N04.8; N05.0-N05.5; N05.8; | | | | | |
| | Болезни конъюнктивы | N10.0-N10.5; N10.8; N11.0-N11.4; N11.8 | Рецидивирование и прогрессирование воспалительных заболеваний; прогрессирование дегенеративных заболеваний; наличие инородного тела внутри глаза; косоглазие, в том числе оперированное, | I-VI | I-VI | | |
| | Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела, | N15.0; N15.1; N15.8; N16.0-N16.4; N16.8; N17.0; N17.1; N17.8; N18.0-N18.8; N20.0-N20.2; N20.8; N21.0-N21.5; | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|---|
| Болезни сосудистой оболочки и сетчатки, | Н21.8; Н30.0-Н30.2; Н30.8; Н31.0-Н31.4; Н31.8; Н33; Н34.0-Н34.2; Н34.8; Н35.0-Н35.8; | сопровождающиеся нарушениями бинокулярного зрения и конвергенции; диплопия | Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня | I | - | |
| | | | | | | |
| Болезни стекловидного тела и глазного яблока, болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, | Н43.0-Н43.3; Н43.8; Н44.0-Н44.8; Н49.0-Н49.4; Н49.8; Н50.0-Н50.8; Н51.0-Н51.2; Н51.8; Н52.0-Н52.6; | Выраженная степень (более 5 градусов) скрытого косоглазия (гетерофории) | Преходящие без признаков декомпенсации, без нарушения зрительных функций | I | I | |
| | | | | | | |
| Другие болезни глаза и его придаточного аппарата | Н55; Н57.0; Н57.1; Н57.8; Н59.0; Н59.8 | Катаракта, артрифакция односторонняя или двусторонняя | Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня | I-VI | - | |
| | | | | | | |
| Болезни хрусталика | Н25.0-Н25.2; Н25.8; Н26.0-Н26.4; Н26.8; Н27.0; Н27.1; Н27.8 | Катаракта, артрифакция односторонняя или двусторонняя | Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня | I-VI | I-VI | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Отсутствие или наличие анатомических нарушений в глазах с артрифакцией должно быть подтверждено данными инструментальных исследований |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|--|
| 35. Глаукома | H40.0-H40.6; H40.8 | Глаукомная нейрооптикопатия при глаукоме III и IV стадии независимо от уровня компенсации внутриглазного давления, при глаукоме I и II стадии нестабилизированной некомпенсированной Глаукомная нейрооптикопатия при глаукоме I и II стадии компенсированной и стабилизированной медикаментозно и/или оперативно | Нарушение зрительных функций в степени, соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня | I-VI | I-VI | |
| 36. Болезни зрительного нерва и зрительных путей другие нарушения содружественного движения глаз, нарушения рефракции и аккомодации, зрительные расстройства и слепота | H46; H47.0-H47.6; H51.1; H52.0-H52.6; H53.0-H53.6; H53.8; H54.0-H54.6 | Атрофия зрительного нерва, нарушения зрительных функций | Нарушение зрительных функций высокой степени, соответствующей допустимым значениям настоящего пункта Нарушение зрительных функций умеренной степени, соответствующей допустимым значениям настоящего пункта Нарушение зрительных функций минимальной степени, соответствующей допустимым значениям настоящего пункта | I-VI I | I-VI I (кроме кочетара паровоза в депо) | Недостаточность конвергенции (конвергенция недостаточная и избыточная) |
| | | Сужение полей зрения на 30 и более градусов в любом меридиане; понижение | Нарушение зрительных функций высокой степени | I-VI | I-VI | |

| | | | | | |
|--|---|---|------|---------------------------------------|--|
| | <p>остроты зрения с коррекцией сферической линзой (Очковой или контактной) не сильнее $\pm 5,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 2,0$ дптр или без коррекции, на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3;</p> <p>состояние после хирургической коррекции исходного нарушения рефракции любой степени при наличии остроты зрения на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3, в случае невозможности очковой или контактной коррекции; патология цветового зрения</p> | | | | |
| | <p>Снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению; расстройство бинокулярного зрения; протаномалия и дегтераномалия типа «А»</p> | <p>Нарушение зрительных функций высокой степени</p> | I-VI | I-VI | |
| | <p>Сужение полей зрения от 20 до 29 градусов в любом меридиане; понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (Очковой или контактной) не сильнее $\pm 3,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 1,5$ дптр ниже 0,8 на каждом глазу; анизометропия более 2,0 дптр; состояние после хирургической коррекции исходного нарушения</p> | <p>Нарушение зрительных функций умеренной степени</p> | I-VI | I (кроме кочегара паровоза в депо) | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------|---------------------------------------|--|
| | | | рефракции остекнокор степени при наличии остроты зрения на каждом глазу ниже 0,8, в случае невозможности очковой или контактной коррекции | | | | |
| | | | Протаномалия и дейтераномалия типа «В»; снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению | Нарушение зрительных функций умеренной степени | I-VI | I (кроме кочетара паровоза в депо) | |
| | | | Сужение полей зрения от 10 до 19 градусов в любом меридиане, понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (очковой или контактной) не сильнее $\pm 1,5$ дптр с цилиндром – не сильнее $\pm 1,0$ дптр ниже 1,0 на каждом глазу | Нарушение зрительных функций минимальной степени | I | I (кроме кочетара паровоза в депо) | |
| | | | Врожденная (протаномалия и дейтераномалия типа «С»), пороговое понижение цветового зрения ближе к аномальной) и приобретенная патология цветового зрения | Нарушение зрительных функций минимальной степени | I | I (кроме кочетара паровоза в депо) | |
| | | | Снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению | | | | |
| VIII Болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | | | |
| 37. | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка, болезни внутреннего уха, | H65.0-H65.4; H66.0-H66.4; H68.0-H68.1; H69.0; H69.8; H70.0-H70.2; H70.8; H71; | Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение; воспалительные упорно текущие хронические заболевания уха с частыми | Тяжелые, часто рецидивирующие или заболевания уха с нарушением вестибулярной, слуховой функции | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|------|---|--|------------------------------------|
| другие болезни уха | Н72.0-Н72.2; Н72.8; Н73.0; Н73.1; Н73.8; Н74.0-Н74.4; Н74.8; Н80.0-Н80.2 Н80.8; Н81.0-Н81.4; Н81.8; Н83.0-Н83.3; Н83.8; | обострениями (более двух раз в год) и нарушением слуховой функции | Часто рецидивирующие без нарушения вестибулярной и слуховой функции | I | - | | |
| | | | | | | | |
| | Н90.0-Н90.7; Н91.0-Н91.3; Н91.8; Н92 Н93.0-Н93.3; Н93.8; Н95.0; Н95.1; Н95.8 | Состояние после успешной стапедопластики, тимпанопластики 4-5 типа | Значительная степень нарушения функции | I-VI | I | | После хирургического вмешательства |
| | | | | | | | |
| | | Стойкое снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на речевых частотах (500, 1000, 2000 Гц) от 21 до 30 децибел (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе | Умеренная степень нарушения функции | I-VI | - | | |
| | | | | | | | |
| | | После эффективной коррекции | I-VI | I | | | |

IX Болезни системы кровообращения

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|------|----------|---|
| 38. | Хронические ревматические болезни сердца, | 105.0-105.2; 105.8; 106.0-106.2; 106.8; 107.0-107.2; 107.8; 108.0-108.3; 108.8; 109.0-109.2; 109.8; | Хроническая сердечная недостаточность II – III стадии (II-IV функционального класса) с нарушениями гемодинамики; недостаточность любого клапанного аппарата сердца 3-4 степени; | С выраженными нарушениями функции | I-VI | I-VI | |
| | | | Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса I стадии с нарушениями гемодинамики; недостаточность любого клапанного аппарата сердца 2 степени; | С умеренными нарушениями функции | I-VI | I, III-V | |
| | неревматические поражения митрального клапана, | 134.0-134.2; 134.8; | Врожденные и приобретенные пороки сердца после эффективной хирургической коррекции без нарушений ритма высоких градаций, хронической сердечной недостаточности. Кисты и дивертикулы перикарда без нарушений функций сердца, после хирургического лечения и без постоянной антикоагулянтной терапии. Состояние после удаления внутрисердечных тромбов сердца | | I | - | После эффективного хирургического лечения |
| | неревматические поражения трехстворчатого клапана, | 136.0-136.2; 136.8; | Постмиокардитический кардиосклероз без | | I-VI | - | После эффективного |
| | поражения клапана легочной артерии | 137.0-137.2; 137.8 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|------|------|---|
| | | | нарушений ритма высоких градаций | | | | терапевтического лечения |
| | | | Нарушения ритма и проводимости сердца высоких градаций | I-VI | I-VI | | С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска |
| | | | | I-VI | - | | С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции |
| | | | | I-VI | I-VI | | С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора |
| 39. | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 110-113 | Гипертоническая болезнь III стадии, симптоматическая артериальная гипертония 3 степени, гипертоническая болезнь с артериальной гипертонией 2 степени и симптоматическая артериальная гипертония 2 степени при кризовом течении, симптоматическая артериальная гипертония 2 степени с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и при недостижении целевого уровня артериального давления и/или с выраженной гипертрофией стенки левого желудочка | С экстремальным и очень высоким риском осложнений (не применяется после проведения эффективного хирургического лечения симптоматической артериальной гипертонии) | I-VI | I-VI | |
| | | | Гипертоническая болезнь II стадии, симптоматическая | I-VI | I | | С высоким риском осложнений |

| | | | | | |
|--|---|--|---|------|---|
| | артериальная гипертония 1-2 степени с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и при недостижении целевого уровня артериального давления | | I | | |
| | Гипертоническая болезнь I стадии, симптоматическая артериальная гипертензия I степени | | I-VI | I-VI | С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска |
| | Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций | | I-VI | - | С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции |
| | | | I-VI | I-VI | С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора |
| 40. Стенокардия [грудная жаба], хроническая ишемическая болезнь сердца, | I20.0; I20.1; I20.8; I25.0-I25.6; I25.8 | Постинфарктный кардиосклероз с хронической сердечной недостаточностью II-III стадии; аневризмы сердца, в том числе вследствие травм; стабильная стенокардия напряжения II – IV функционального класса; безболевая ишемия миокарда; наличие гемодинамически | С опасным прогнозом и выраженными функциональными нарушениями | I-VI | |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| <p>значимого стенозирующего атеросклеротического поражения хотя бы одной основной коронарной артерии; наличие миокардиальных («мышечных») мостиков, приводящих к развитию ишемии миокарда (после эффективного хирургического лечения – годы)</p> | <p>С умеренными функциональными нарушениями</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI (кроме начальников и инженеров) I, III-V (кроме начальников и инженеров)</p> | <p>Состояние после эффективной хирургической коррекции (стентирование коронарных сосудов) при отсутствии стенокардии напряжения или безболевой ишемии миокарда</p> |
| | | | | |
| <p>Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска</p> |
| | | | | |
| <p>Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции</p> |
| | | | | |
| <p>Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | <p>С нарушениями ритма сердца после</p> |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|------|------|---|
| другие формы легочно-сердечной недостаточности, другие болезни перикарда, кардиомиопатия | I27.1; I27.8 | Легочная гипертензия II-IV функционального класса по классификации Всемирной организации здравоохранения | С выраженным и умеренным нарушением функции | I-VI | I-VI | успешной имплантации кардиостимулятора |
| | I31.0-I31.3; I31.8; I42.0-I42.8 | Хроническая сердечная недостаточность II-III стадии, III-IV функционального класса; гипертрофическая кардиомиопатия; дилатационная кардиомиопатия; рестриктивная кардиомиопатия и констриктивный перикардит; тромбы в полости сердца; перикардит хронический (с выпотом >10 мл), констриктивный; наличие в анамнезе тромбозов/болии легочной артерии | С опасным прогнозом, прогрессирующее, с выраженными нарушениями функции | I-VI | I-VI | |
| | | Хроническая сердечная недостаточность I стадии, I-II функционального класса | С умеренными нарушениями функции | I-VI | I | |
| | | Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций | | I-VI | I-VI | С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска |
| | | | | I-VI | - | С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|------|---|--|
| | | | | I-VI | I-VI | С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора | |
| 41. | Другие уточненные поражения сосудов мозга, | 167.8 | Хроническая ишемия головного мозга II и III стадии, а также при наличии осложнений | С умеренным и выраженным нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | болезни артерий, артериол и капилляров, | <p>I71.0-I71.6; I71.8; I72.0-I72.6; I72.8; I73.0; I73.1; I73.8; I74.0-I74.5; I74.8; I77.0-I77.6; I77.8; I78.0; I78.1; I78.8;</p> | <p>Артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов, в том числе после травм; сосудистые мальформации; наличие в анамнезе тромбозов/боли легочной артерии; состояние после перенесенного субарахноидального кровоизлияния, внутримозгового кровоизлияния, инфаркта мозга; облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбангит, аортоартериит при декомпенсированных ишемиях конечностей (гангренозно-некротическая стадия); атеросклероз магистральных артерий головы с гемодинамически значимым стенозом; брюшного отдела аорты с частичной или полной облитерацией просвета ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий с резким нарушением функций</p> | <p>Со значительным нарушением кровообращения и функции</p> | I-VI | I-VI | |
| | <p>Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках,</p> | <p>I80.0-I80.3; I80.8; I81; I82.0-I82.3; I82.8; I83; I85; I86; I87.0; I87.8; I88.0; I88.1; I88.8; I89.0; I89.1; I89.8</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|
| | <p>органов и дистального кровообращения; тромбоз воротной или полой вены; часто реплицирующий тромбоз флебит, флеботромбоз, варикозная болезнь нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 4 степени (открытая «активная» венозная язва); посттромбофлебитический синдром 3 стадии; наличие имплантированного кава-фильтра; ангиотрофоневрозы II – III стадии с выраженным и продолжительным болевым синдромом, выраженным посинением пальцев, скованностью движений на холоде при безуспешном повторном стационарном лечении</p> | С умеренным нарушением кровообращения и функции | I-VI | I, II (дежурный по парку железнодорожной станции, дежурный по разрезу), III-VI (кроме дежурного по поезду, электрогазосварщика, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщика ручной сварки работающего на | |
|--|--|---|------|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | отсутствии эндovasкулярного лечения | | | железнодорожных путейх) | |
| | <p>Облитерирующий эндартрит, тромбангит, атеросклероз сосудов нижних конечностей I стадии;</p> <p>посттромбофлебитический синдром нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности I степени; состояния после эффеkтивных реваскуляризации, эндovasкулярных вмешательств</p> | С незначительным нарушением кровообращения и функции | <p>II (дежурный по парку железнодорожной станции, дежурный по разъезду), III-VI (кроме дежурного по поезду, электрогазосварщика, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщика ручной сварки (работающего на железнодорожных путях)</p> | - | |
| | <p>Последствия реконструктивных операций на крупных магистральных (аорта, подвздошная, бедренная, магистральные артерии головы, воротная или полая вена) и периферических сосудах при сохраняющемся выраженном нарушении кровообращения и прогрессирующем течении заболевания</p> | <p>Последствия реконструктивных операций на сосудах со значительным нарушением кровообращения и функции</p> | I-VI | I-VI | |
| | <p>Последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосудах с</p> | <p>Последствия реконструктивных операций на сосудах с умеренным и</p> | I-VI | I-VI (кроме дежурного по железнодорожной станции, диспетчера | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Гипотензия | 195 | Умеренным и незначительным нарушением кровообращения | незначительным нарушением кровообращения и функции | | Маневрового железнодорожной станции, диспетчера поездного, диспетчера станционного, начальника и инженеров) | | С потерей сознания или синкопальными состояниями | |
| | | | Все формы хронической первичной патологической артериальной гипотензии с потерей сознания в анамнезе (за исключением вызванных лекарственными средствами) | | I-VI | I-VI | | | |
| | | | Стойкая первичная артериальная гипотензия в покое (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст., диастолическое – менее 60 мм рт. ст.); ортостатическая нетолерантность | Стойкая без нарушений сознания | I-VI | I | | | |
| X Болезни органов дыхания | | | | | | | | | |
| 42. | Другие болезни верхних дыхательных путей, | J30.0-J30.3; J31; J32.0-J32.4; J32.8; J33.0; J33.1; J33.8; J34.0-J34.3; J34.8; J35.0-J35.3; J35.8; J36; J37; J38; J39.0-J39.3; | Стойкие нарушения носового дыхания и голосообразования при нарушении профессионально значимых функций | Тяжелые формы со значительным (выраженным) стойким выраженным нарушением функции | I-VI | I-VI | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------|------|--|
| | J39.8 | | Тяжелые формы со значительным (выраженным) выраженным нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| Хронические болезни нижних дыхательных путей | J40-J42; J43.0-J43.2; J43.8; J44.0; J44.1; J44.8; J47; | Хроническая дыхательная недостаточность II и III степени, в том числе вследствие ранений, травм и операций на бронхолегочном аппарате; буллезная эмфизема (Одиночная и/или множественные буллы), в том числе осложненная пневмотораксом без радикального лечения; состояние после перенесенного спонтанного пневмоторакса без радикального устранения его причины, прогрессирующее течение | | I-VI | | |
| Болезни лёгкого, вызванные внешними агентами, | J60-J66.; J67.0-J67.8; J68.0-J68.4; J68.8; J69; J70 | | | | | |
| Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань, | J80-J82; J84.0-J84.1; J84.8; | | | | | |
| Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, | J85-J86; | | | | | |
| Другие болезни плевры, | J90; J92; J93.0; J93.1; J93.8; J94.0-J94.2; J94.8; | | | | | |
| Другие болезни органов дыхания, | J95.0-J95.5; J95.8; J96.0; J96.1; J98.0-J98.8 | | | | | |
| астма, | J45.0; J45.1; J45.8; | Объем форсированного выдоха менее 80% от должных значений; | Персистирующая среднетяжелого и тяжелого течения с умеренным и значительным (выраженным) | I-VI | I-VI | |
| астматический статус [status asthmaticus] | J46 | вариабельность пиковой скорости выдоха более 30%; частые ночные симптомы | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | | <p>(более одного раза в неделю); ежедневное использование ингаляционных симпатомиметиков короткого действия</p> <p>Объем форсированного выдоха более 80% от должных значений; вариабельность пиковой скорости выдоха менее 30%; непродолжительные ночные симптомы (не более одного раза в неделю), которые легко купируются ингаляционными симпатомиметиками, при отсутствии симптомов и нормальной функции легких между обострениями</p> | стойким нарушением функции | Легкого течения с незначительным нарушением функции | I (Машинисты, работающие без помощника) | - | |
|--|--|---|----------------------------|---|--|---|--|

XI Болезни органов пищеварения

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|------|--|
| 43. | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | <p>K20; K21; K22.0-K22.8; K25-K28; K29.0-K29.8; K30; K31.0-K31.8</p> | <p>Хронические болезни с тяжелым часто рецидивирующим течением (более двух раз в год), с дефицитом массы тела (индекс массы тела менее 17) и/или с кровотечением, перфорацией, пенетрацией, в том числе в анамнезе; декомпенсированным стенозом выходного отдела желудка; экстирпация или субтотальная резекция желудка, последствия других операций на желудке со стойким демпинг-синдромом, диареей,</p> | Тяжелая степень со значительным (выраженным) стойким нарушением функции или прогностически опасные | I-VI | I-VI | |
|-----|--|--|--|--|------|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--|------|------|--|
| | | <p>дефицитом массы тела (индекс массы тела менее 17)</p> <p>Болезни пищевода (доброкачественная стриктура или ахалазия) без дефицита массы тела и рецидивирующей рвоты, язвенная болезнь с обострениями два и более раз в год, последствия стеноловой или селективной ваготомии, резекция желудка; наложение желудочно-кишечного анастомоза без эрозивно-язвенных изменений в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, мальабсорбции; демпинг-синдром</p> | | | | | |
| 44. | Грыжи | К40-К46 | <p>Больших размеров наружные грыжи, требующие для выправления ручного пособия или горизонтального положения тела, либо нарушающие функцию внутренних органов; диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы) и другие грыжи, нарушающие функцию органов или с частыми (более двух раз в год) ущемлениями; ventральные грыжи, повторно рецидивирующие грыжи, грыжи, повяжющиеся при физических нагрузках,</p> | <p>Больших и умеренных размеров или рецидивные со значительным (выраженным) стойким нарушением функции</p> | I-VI | I-VI | <p>I (машинисты, работающие без помощника)</p> |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|------|------|--|
| | | | | | | | |
| 45. | Неинфекционный энтерит и колит | К50.0-К50.8; К51.0-К51.8; К52.0-К52.8 | Кашле; неэффективное хирургическое лечение или отказ от него | Тяжелая и средняя степень с умеренным и значительным (выраженным) стойким нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | Другие болезни кишечника, | К55.0-К55.3; К55.8; К56.0-К56.6; К57; К58.1-К58.3; К58.8; К59.0-К59.4; К59.8; К60; К61; К62.0-К62.8; К63.0-К63.5; К63.8; К64.3; К64.5; К66.0-К66.2; К66.8 | Острые и хронические соустье болезни кишечника с осложненным клиническим течением; дивертикулярная болезнь тонкой или толстой с прободением или абсцессом; синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи; свищи области заднего прохода и прямой кишки, в том числе стойкие или часто рецидивирующие (более двух раз в год); выпадение заднего прохода, выпадение прямой кишки 2-3 стадии, в фазе декомпенсации, недостаточность анального | Осложненные формы с обострениями с умеренным и значительным (выраженным) стойким нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | Другие поражения брыжжины | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------|--|--|
| | | <p>сфинктера 2-3 степени; функционирующие кишечные свищи с нарушением пищеварения и питания (индекс массы тела менее 17); брыжинные спайки с нарушениями кишечной проходимости, при неэффективном хирургическом лечении; геморрой 4 степени и периферические венозные тромбоз с клиническими проявлениями (выпадение геморроидальных узлов, кровотечение), частые обострения (более двух раз в год), при неэффективности консервативной терапии; состояние после резекции тонкой или толстой кишки, сопровождающиеся нарушением пищеварения и нарушением питания</p> | <p>Легкая степень с незначительным нарушением функции</p> | I, V | I (машинисты, работающие без помощника) | |
| 46. | Болезни печени, | <p>К70.0-К70.4; К71.0-К71.8; К72.0; К72.1; К73.0-К73.2;</p> <p>Декомпенсированное поражение печени (с высоким цитололизом, гипотальбулинемией,</p> | <p>Эффективная терапия месалазином и глюкокортикостероидами с достижением устойчивой ремиссии при отсутствии побочных эффектов</p> <p>Без нарушения функции</p> | I-VI | I | |
| | | <p>Декомпенсированное поражение печени (с высоким цитололизом, гипотальбулинемией,</p> | <p>Тяжелая степень со значительным (выраженным) нарушением функции</p> | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|----------|--|
| <p>болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы,</p> | <p>К73.8; К74; К75.0-К75.4; К75.8; К76; К76.0-К76.8; К80; К81.0; К81.1; К81.8; К82.0-К82.4; К82.8; К83.0-К83.5; К83.8; К85.0-К85.3; К85.8; К86.0-К86.3; К86.8;</p> | <p>холестазаом, портальной гипертензией III степени); состояния после резекций печени с тяжелыми функциональными нарушениями, наложения билиодигестивных анастомозов; осложнения после хирургического лечения (желчный, панкреатический свищ и другие); желчнокаменная болезнь, осложненная холециститом, холангитом, печеночными коликами; исходы деструктивных панкреатитов в виде кисты, тяжелого фиброза, калькулеза, состояния после резекции поджелудочной железы; состояние после резекции пищевода, желудка или наложения желудочно-кишечного соустья, резекции тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки при значительном нарушении функций пищеварения (не поддающийся лечению демпинг-синдром, упорные поносы и другие) или выраженном упадке питания (ИМТ 18,5 -19,0 и менее)</p> | <p>Средняя степень с умеренным нарушением функции</p> | <p>I-VI</p> | <p>I</p> | |
| <p>нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> | <p>К91.1; К91.8</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | I-II степени); камни желчного пузыря без признаков холецистита, холангита; хронический панкреатит с клиническими проявлениями внешнесекреторной недостаточности, умеренно рецидивирующего течения без выраженных осложнений; состояние после резекции желудка, тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки, наложения желудочно-кишечного соустья с редкими проявлениями демпинг-синдрома (неустойчивый стул, нарушение питания) | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

XII Болезни кожи и подкожной клетчатки

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|--|--|
| 47. Псориаз, акродерматит стойкий [Аглопо], пустулез ладонный и подошвенный, пузырчатка [пемфигус], | L40.0; L40.1; L40.4; L40.5; L40.8 | Псориатическая эритродермия, покраснение кожи и отечность, зуд, повышенная температура; генерализованный прогрессирующего течения | Тяжелая форма, неподдающаяся системной, иммунобиологической терапии | I-VI | I-VI | | |
| | L40.2 | Сливающиеся в «гнойные озера», деформация дистальных фаланг, дистрофические изменения кистей и пальцев | Средняя и тяжелая форма, неподдающаяся иммунобиологической терапии | I-VI | I-VI | | |
| | L40.3 | Множественные пустулезные высыпания | Средняя и тяжелая форма, неподдающаяся иммунобиологической терапии | I-VI | I-VI | | |
| | L10.0-L10.5; | Акантолиз эпидермиса | Легкая, средняя, | I-VI | I-VI | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|------|------|--|
| атопический дерматит, | L10.8 | | тяжелая степень нарушения функции | | | |
| | L20.0; L20.8 | Выраженный зуд, приводящий к нарушениям сна; присоединение вторичной инфекции; стрепто-стафилодермия; атрофические и гипертрофические рубцы; прогрессирующее течение (поражение кожи более 10%, частота обострений более 5 раз в год) | Тяжелая форма нарушения функции, неподдающаяся иммунобиологической терапии | I-VI | I-VI | |
| дерматит неуточненный, | L30.9 | Зуд, приводящий к нарушениям сна и неврогическим расстройствам; распространенная пиодермия | Тяжелая форма нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| | L08.0 | Глубокая стрепто-стафилодермия с длительным течением, до нескольких лет; язвенные дефекты, приводящие к развитию остеомиелита; нарушение функции конечностей, развитие контрактур и выраженных рубцовых изменений | Тяжелая форма нарушения функции | I-VI | I-VI | |
| XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 48. Реактивные артропатии, | M02.0-M02.3; M02.8; | С сохранением стойкой высокой активности заболевания, несмотря на проводимую противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию и нарушениями функции органов и систем; | С выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, потенциально необратимыми или необратимыми | I-VI | I-VI | |
| | M05.0-M05.3; M05.8; | | | | | |
| | M06.0-M06.4; M06.8; | | | | | |
| другие ревматоидные артриты, | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|----------|--|
| <p>юношеский [ювенильный] артрит, подагра, другие кристаллические артропатии, полиартроз, коксартоз [артроз тазобедренного сустава], гонартоз [артроз коленного сустава], другие артрозы, системные поражения соединительной ткани, спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия, другие бурсопатии, поражения плеча, энтезопатии нижней конечности, исключая</p> | <p>М08.0-М08.4; М08.8; М10.0-М10.4; М11.0-М11.2; М11.8; М15.0-М15.4; М15.8; М16.0-М16.7; М17.0-М17.5; М19.0-М19.2; М19.8; М30.0; М31.0-М31.8; М32.0; М32.1; М32.8; М33.0-М33.2; М34.0-М34.2; М34.8; М35.0-М35.8; М66.0-М66.4; М71.0-М71.5; М71.8; М75.0-М75.6; М75.8; М76.0-М76.8;</p> | <p>стойкие деформации и контрактуры суставов, выраженная недостаточная функциональная компенсация (П ФК), болевой синдром при физической нагрузке, стойкая утрата способности исполнять профессиональные обязанности</p> <p>На фоне применения поддерживающих протизовоспалительной и иммуносупрессивной терапии</p> | <p>поражениями различных органов и систем</p> <p>С умеренным нарушением функций опорно-двигательного аппарата</p> | <p>I-VI</p> | <p>I</p> | |
|--|--|--|---|-------------|----------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|---------------------------------|------|------|--|
| 49. | Дорсопатгии | M40.0-M40.4; | Травматическая | Со значительным | I-VI | I-VI | | стопу, другие энтезопатгии, приобретенные деформации пальцев рук и ног, другие приобретенные деформации конечностей, другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | M77.0-M77.5; M77.8 | | | | |
| | | | | | | | | M20.0-M20.5; M21.0-M21.8; M95.8; M96 | Укорочение руки более 5 см. или ноги более 5 см. Длинные трубчатых костей со значительным нарушением функции конечности (I-III); застарелые вывихи трех и более пястных костей; разрушение, дефекты и состояние после артропластики трех и более пястно-фаланговых суставов со стойким нарушением функции; застарелые повреждения сухожилий глубоких сгибателей трех или более пальцев проксимальнее уровня пястных костей при нарушении профессионально значимых функций; металлоостеосинтез с нарушением функции и болевой синдромом | С выраженным нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | | | Укорочение ноги от 2 см. до 5 см. включительно | С умеренным нарушением функции | I, III-VI | I, III-VI | | | | | | | |
| | | | Застарелые вывихи лучезапястного сустава при сохранении профессионально значимых функций | С незначительным нарушением функции | V | - | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | <p>М41.0-М41.5; М41.8; М42.0; М42.1; М43.0-М43.6; М43.8; М47.0-М47.2; М47.8; М48.0-М48.5; М48.8; М50.0-М50.3; М50.8; М51.0-М51.4; М51.8; М53.0-М53.3; М53.8; М54.0-М54.6; М54.8</p> | <p>спондилопатия со значительным нарушением функции; клиновидная деформация II - III степени тел двух и более позвонков вследствие переломов; остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени; распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клиновидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений с болевым синдромом; спондилолистез I и II степени (смещение на 1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка соответственно) с болевым синдромом; состояние после удаления межпозвонковых дисков при наличии чувствительных и двигательных расстройств, выраженного болевого синдрома</p> | <p>нарушением функции</p> | <p>I, III (составитель поездов), V, VI</p> | <p>I, III (составитель поездов), V (кроме дежурного по поезду), VI</p> | |
| | | <p>Фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся ротацией позвонков</p> | <p>С умеренным нарушением функции</p> | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| | | <p>(сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией трех и более позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в два и более раза и другие), с незначительной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью I степени; ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел трех и более позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение трех и более межпозвонковых дисков), с болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими признаками деформаций</p> | | | | |
| <p>50. Нарушения плотности и структуры кости,</p> | <p>М80.0-М80.5; М80.8; М81.0-М81.6; М81.8; М83.0-М83.5; М83.8; М84.0-М84.4; М84.8; М85.0-М85.6; М85.8</p> | <p>Остеониелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживающих или отрывающихся свищей не реже одного раза в год; остеониелит (в том числе и первично хронический) с ежегодными обострениями при отсутствии секвестральных полостей и секвестров</p> | <p>С ежегодными обострениями и наличием свищей</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |
| | <p>М86.0-М86.6;</p> | <p>Остеониелит с обострениями раз в 2-3 года без осложнений</p> | <p>С редкими обострениями</p> | <p>I</p> | <p>-</p> | |
| | | <p>Анкилоз крупного сустава в</p> | <p>Со значительным</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| <p>другие остеопатии,</p> <p>хондропатии,</p> | <p>М86.8; М88.0; М88.8; М89.0-М89.6; М89.8; М91.0-М91.3; М91.8; М92.0-М92.8; М93.0-М93.2; М93.8; М94.0-М94.3; М94.8</p> | <p>порочном положении; фиброзный анкилоз; искусственный сустав при плохой функциональной компенсации; патологическая подвижность (не опорный сустав) или стойкая контрактура сустава со значительным ограничением движений; деформирующий артроз крупных суставов II-III стадии с частыми (более двух раз в год), рецидивами обострений болевого синдрома, разрушениями суставного хряща или деформацией оси конечностей; дефект костей более 1 см с нестабильностью конечности; асептический некроз головки бедренной кости II-III стадии; частые привычные вывихи крупных суставов, возникающие вследствие незначительных физических нагрузок, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофией мышц конечностей</p> | <p>нарушением функции организма человека</p> | <p>1, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | <p>1, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | |
| | | <p>Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с умеренным ограничением объема движений до 20% от возрастной нормы; состояние после</p> | <p>С умеренным нарушением функции</p> | <p>1, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | <p>1, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | <p>Функции: остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени;</p> <p>распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клиновидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений с болевым синдромом; спондилостез I и II степени (смещение на 1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка соответственно) с болевым синдромом; состояние после удаления межпозвонковых дисков при наличии чувствительных и двигательных расстройств, выраженного болевого синдрома</p> | С умеренным нарушением функции | I, III (составитель поездов), V, VI | I, III (составитель поездов), V (кроме дежурного по поезду), VI | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|---|------|------|--|
| | | <p>поверхности тела позвонка в два и более раза и другие) с незначительной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью I степени; отграниченный деформирующий спондилез (поражение тел трех и более позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение трех и более межпозвонковых дисков) с болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими</p> | | | | |
| остеонекроз | <p>M87.0-M87.3; M87.8</p> | <p>признаками деформаций</p> <p>С сохранением стойкой высокой активности заболевания, несмотря на проводимую противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию, стойкие деформации и контрактуры суставов, выраженная недостаточная функциональная компенсация (ПФК), болевой синдром при физической нагрузке, стойкая утрата способности исполнять профессиональные обязанности</p> | <p>С выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, потенциально необратимыми или необратимыми поражениями различными органами и систем</p> | I-VI | I-VI | |
| | | <p>На фоне применения поддерживающей противовоспалительной и</p> | <p>С умеренным нарушением функций опорно-двигательного</p> | I-VI | I, V | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | |
| <p>ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ</p> <p>Анкилоз крупного сустава в порочном положении; фиброзный анкилоз; истощенный сустав при плохой функциональной компенсации; патологическая подвижность (не опорный сустав) или стойкая контрактура сустава со значительным ограничением движений; деформирующий артроз крупных суставов II - III стадии с частыми (более двух раз в год) рецидивами обострений болевого синдрома, разрушениями суставного хряща или деформацией оси конечностей; дефект костей более 1 см с нестабильностью конечности; асептический некроз головки бедренной кости II-III стадии; частые (более двух раз в год) привывчные вывихи крупных суставов, возникающие вследствие значительных физических нагрузок, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофией мышц конечностей</p> | <p>аппарата</p> <p>Со значительным нарушением функции</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | | |
| | <p>Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с умеренным ограничением</p> | <p>С умеренным нарушением функции</p> | <p>I, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | <p>I, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|-------------------|--|
| | | <p>объема движений до 20% от возрастной нормы; состояние после эндопротезирования одного и более суставов с умеренным нарушением функции</p> <p>Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с незначительным ограничением объема движений, без нарушения профессионально значимых функций</p> <p>Один искусственный сустав с хорошей функциональной компенсацией</p> | <p>С незначительным нарушением функции</p> <p>Состояние после эндопротезирования не более одного сустава</p> | <p>I, V</p> <p>I, III-VI</p> | <p>-</p> <p>-</p> | |
|--|--|---|--|------------------------------|-------------------|--|

XIV Болезни мочеполовой системы

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 51. Гломерулярные болезни, | <p>тубулоинтерстициальные болезни почек,</p> <p>почечная недостаточность,</p> | N00.0-N00.8; N01.0-N01.8; N02.0-N02.8; N03.0-N03.8; N04.0-N04.8; N05.0-N05.8; N06.0-N06.8; N07.0-N07.8; | <p>Скорость клубочковой фильтрации менее 45 мг/мин</p> <p>Скорость клубочковой фильтрации 45-60 мг/мин</p> <p>Скорость клубочковой фильтрации более 60 мг/мин</p> | <p>С хронической болезнью почек в стадии ЗБ, 4, 5</p> <p>С хронической болезнью почек в стадии 3А</p> <p>С хронической болезнью почек в стадии I, 2</p> | <p>I-VI</p> <p>I-VI</p> <p>I, V</p> | <p>I-VI (ЗБ-кроме начальных и инжеров)</p> <p>I</p> <p>-</p> | |
| | | N10; N11.0; N11.1; N11.8; N12; N13.0-N13.8; N14; N15.0; N15.1; N15.8; | | | | | |
| | | N17.0-N17.2; N17.8; | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|-------------|--|
| <p>Сморщенная почка неуточненная,</p> | <p>N18.1-N18.5 N19; N26</p> | | | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |
| <p>Мочекаменная болезнь, другие болезни мочевой системы,</p> | <p>N20.0-N20.2; N21.0; N21.1; N21.8; N23; N30.0-N30.4; N30.8; N31.0-N31.2; N31.8; N32.0-N32.4; N32.8; N34.0-N34.2; N35.0; N35.1; N35.8; N36.0-N36.0; N36.8; N39.0-N39.4; N39.8;</p> | <p>Заболевания, сопровождающиеся значительно выраженными нарушениями выделительной функции почек; мочекаменная болезнь с приступами почечной колики; мочекаменная болезнь при неудовлетворительных результатах лечения (камни, гидронефроз, пиелонефроз, вторичный пиелонефрит, не подающийся лечению и другие); наличие камня более 3 мм в полостной системе почек, мочеточнике, мочевом пузыре; двусторонний нефроптоз II-III стадии с постоянным болевым синдромом, вторичным пиелонефритом, вазореальной гипертензией;</p> | <p>Со значительным нарушением функции</p> | | | |
| <p>Болезни мужских половых органов,</p> | <p>N40; N41.0-N41.3; N41.8; N42.0-N42.3; N42.8; N43; N44; N45; N47; N48.0-N48.6; N48.8; N49.0-N49.2; N49.8; N50.0-N50.1; N50.8</p> | <p>отсутствие одной почки при наличии любой степени нарушения функции оставшейся почки; доброкачественная гиперплазия предстательной железы со значительным нарушением мочеотделения при неудовлетворительных</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | результатах лечения или отказе от него; состоянии после резекции или пластики мочевого пузыря со значительным нарушением функции; склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающийся пузырно-мочеточниковым рефлюксом и вторичным двусторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом | | | | |
| | | | Склероз шейки мочевого пузыря и стриктура уретры при вторичных изменениях мочевого пузыря, не требующих хирургического вмешательства; отсутствие одной почки или нефункционирующая почка без нарушения функции другой | С незначительным нарушением функции | I | - | |
| 52. | Эндометриоз, выпадение женских половых органов, | N80.0-N80.6; N80.8 N81.0-N81.6; N81.8 | С выраженным болевым синдромом, с нарушением функции тазовых органов Опушение женских половых органов со значительным или умеренным нарушением функции тазовых органов, полное выпадение матки и влагалища, сопровождающееся нарушением функции мочеиспускания (недержание мочи); полный разрыв промежности (разрыв, при котором целостность мышц промежности нарушена | | I-VI I-VI | I-VI I-VI | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| свищи с вовлечением женских половых органов | N82.0-N82.5; N82.8 | полностью и они замещены рубцовой тканью, переходящей на стенку прямой кишки, задний проход зияет и не имеет правильных очертаний) | | | | | |
| | | Свищи с вовлечением половых органов (мочеполовые, кишечно-половые) при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него | | | | | |

XV Беременность, роды и послеродовый период

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|--|
| 53. Многоплодная беременность, осложнения, характерные для многоплодной беременности, | O30.0-O30.2; O30.8; O31 | | I | I | Дихориальная двойня |
| | | | I, III-VI | I, III-VI | Монохориальная двойня, многоплодная беременность с большим числом плодов (тройня, четверня) |
| преэклампсия, кровотечение в ранние сроки беременности, чрезмерная рвота беременных, истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери, | O14.0-O14.2; O20.0; O20.8; O21.0-O21.2; O21.8; O34.3; | Задержка роста плода, приращение плаценты, угрожающие | I-VI | I-VI | |
| | | преждевременные роды, кровотечение на ранних сроках, беременность при наличии | | | |
| | | трансплантированных органов; онкологические заболевания | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| <p>недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери,</p> <p>синдромы плацентарной трансфузии,</p> <p>предлежание плаценты,</p> <p>ложные схватки,</p> <p>другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период,</p> <p>существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период,</p> <p>существовавший ранее сахарный диабет I типа,</p> <p>психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период</p> | <p>О36.5;</p> <p>О43.0;</p> <p>О44;</p> <p>О47.0; О47.1;</p> <p>О99.8</p> | <p>Артериальная гипертензия 2-3 степени;</p> <p>Инсулинозависимый сахарный диабет;</p> <p>Беременность на фоне эпилепсии</p> | | <p>I-VI</p> <p>I-VI</p> | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|--|

XVII Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-------------|--|
| <p>54. Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы,</p> | <p>Q00; Q01.0-Q01.2; Q01.8;</p> | <p>Рецидивирующие дермоидные кисты копчика после неоднократного (три</p> | <p>Со значительным или умеренным нарушением функции</p> | <p>I-VI</p> | <p>I-VI</p> | |
|---|---|--|---|-------------|-------------|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица и шеи,</p> | <p>Q02; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q04.0-Q04.6; Q04.8; Q05.0-Q05.8; Q06.0-Q06.4; Q06.8; Q07.0; Q07.8;</p> | <p>два и более) радикального хирургического лечения; деформация грудной клетки с нарушением дыхательной функции 2-3 степени; наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию кистей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и ношение обуви</p> | | | | |
| <p>врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения,</p> | <p>Q10; Q11; Q12.0-Q12.4; Q12.8; Q13.0-Q13.5; Q13.8; Q14.0-Q14.3; Q14.8; Q15.0; Q15.8; Q16.0-Q16.5; Q17.0-Q17.5; Q17.8; Q18.0-Q18.8;</p> | | | | | |
| | <p>Q20.0-Q20.6; Q20.8; Q21.0-Q21.4; Q21.8; Q22.0-Q22.6; Q22.8; Q23.0-Q23.4; Q23.8; Q24.0-Q24.6; Q24.8; Q25.0-Q25.8; Q26.0-Q26.6; Q26.8; Q27.0-Q27.4; Q27.8; Q28.0-Q28.3; Q28.8;</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|--|---|
| врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания, | Q30.0-Q30.3; Q30.8; Q31.0-Q31.5; Q31.8; Q32; Q33.0-Q33.6; Q33.8; Q34.0; Q34.1; Q34.8 | расщелина губы и неба | Q35.1-Q35.7; Q36; Q37.0-Q37.5; Q37.8; | [защя губа и волчья ласть], | другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения, | Q38; Q39.0-Q39.6; Q39.8; Q40.0-Q40.3; Q40.8; 41.0-Q41.2; Q41.8; Q42.0-Q42.3; Q42.8; Q43.0-Q43.8; Q44; Q45.0-Q45.3; Q45.8; | врожденные аномалии [пороки развития] половых органов, | Q50; Q51.0-Q51.8; Q52.0-Q52.8; Q53.0-Q53.2; Q54.0-Q54.4; Q54.8; Q55.0-Q55.6; Q55.8; Q56; | врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы, | Q60; Q61.0-Q61.5; Q61.8; Q62; Q63.0-Q63.3; |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|--|---|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы,</p> | <p>Q63.8; Q64.0-Q64.8; Q65.0-Q65.6; Q65.8; Q66.0-Q66.8; Q67.0-Q67.8; Q68.0-Q68.5; Q68.8; Q69.0-Q69.2; Q70.0-Q70.4; Q71.0-Q71.6; Q71.8; Q72.0-Q72.8; Q73; Q74.0-Q74.3; Q74.8; Q75.0-Q75.5; Q75.8; Q76.0-Q76.8; Q77.0-Q77.8; Q78.0-Q78.6; Q78.8; Q79.0-Q79.6; Q79.8</p> | | | | |
| <p>другие врожденные аномалии [пороки развития],</p> | <p>Q80.0-Q80.4; Q80.8; Q81.0-Q81.2; Q81.8; Q82.0-Q82.5; Q82.8; Q83.0-Q83.3; Q83.8; Q84.0-Q84.6; Q84.8; Q85.0; Q85.1; Q85.8; Q86; Q87; Q89.0-Q89.4; Q89.7; Q89.8;</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|--|
| | <p>Атриовентрикулярная блокада III степени; далеко зашедшая атриовентрикулярная блокада II степени; персистирующая атриовентрикулярная блокада II ст. Мобитц тип II; преходящие эпизоды атриовентрикулярной блокады II ст. Мобитц тип II со значимой брадикардией и с гемодинамически значимыми паузами (более 3 сек), сочетающаяся с хронотропной некомпетентностью сердца; атриовентрикулярная блокада, возникающая при физической нагрузке; атриовентрикулярная блокада в сочетании с блокадой ножек пучка Гиса; полная блокада левой ножки пучка Гиса; бифасцикулярные блокады, перемежающаяся блокада ножек пучка Гиса, трехпучковая блокада; остановка сердца в анамнезе</p> | | I-VI | - | <p>После успешной малонивазивной коррекции</p> |
| | <p>Успешная малонивазивная хирургическая деструкция аритмогенных зон (электрофизиологическое исследование с радиочастотной катетерной абляцией) (не более 500 экстрасистол из аблационной зоны)</p> | | I-VI | I-VI | <p>После успешной имплантации</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|---|------------------------------------|------|--|--|
| | наблюдение за течением нормальной беременности, наблюдение за течением беременности у женщины, подверженной высокому риску, | Z34.0; Z34.8; | кардиостимулятора | | I | I | кардиостимулятора | Пациенты групп риска акушерских и перинатальных осложнений |
| | | Z35.0-Z35.8 | | | | | | |
| | наличие имплантатов других костей и сухожилий, | Z96.7 | Дефект костей свода и основания черепа, в том числе с замещенным пластическим материалом 20 и более кв. см, или наличие дефекта, не замещенного пластическим материалом | Со значительным нарушением функции | I-VI | I-VI | | |
| | | Z98 | | | | | | |
| 56. | Другие послехирургические состояния | Z90.2-Z90.7 | Состояние после хирургического лечения с применением спондило и корпородеза; | Наличие металлических конструкций, не подлежащих удалению | Со значительным нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | | | | | | | | |
| | Приобретенное отсутствие органов, не классифицированное в других рубриках | Z90.2-Z90.7 | Отсутствие полового члена проксимальнее уровня венечной борозды | Отсутствие полового члена до уровня венечной борозды; | Со значительным нарушением функции | I-VI | I-VI (кроме дежурного по железнодорожной станции, диспетчера | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|------|------|--|
| Приобретенное отсутствие конечности | Z89 | Отсутствие по три пальца на уровне пястно-фаланговых суставов на каждой кисти; по четыре пальца на уровне дистальных концов основных фаланг на каждой кисти; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях; отсутствие кисти на уровне пястных костей; отсутствие на одной кисти: трех пальцев на уровне пястно-фаланговых | С выраженным нарушением функции | I-VI | I-VI | |
| | | Состояние после удаления доли легкого; состояние после резекции желудка; состояние после удаления почки и других отделов мочевого тракта; отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки; отсутствие селезенки | С незначительным нарушением функции | I | - | Маневрового железнодорожной станции, диспетчера поездного, диспетчера станционного, начальника железнодорожной станции (несущего сменные дежурства по станции) |
| | | Отсутствие почки при нарушении функции оставшейся почки независимо от степени выраженности; | | I-VI | I-VI | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | | <p>суставов; четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов; первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго – пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг; первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях; отсутствие всех пальцев или части стопы на любом ее уровне</p> | <p>С умеренным нарушением функции</p> | I, VI | I, VI | |
| | | <p>Отсутствие первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго пальца на уровне основной фаланги или третьего -пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти; второго – четвертого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти; по три пальца на уровне проксимальных концов средних фаланг на каждой кисти; первого или второго пальца на уровне пястно-фалангового сустава на одной кисти; первого пальца на уровне межфалангового сустава на правой (для левши – на левой) кисти или на обеих кистях; двух пальцев на уровне</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | Проксимального конца основной фаланги на одной кисти; дистальных фаланг второго – четвертого пальцев на обеих кистях при сохранении профессионально значимых функций | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|